

Длюетт.

Середньостиглий універсальний сорт з червоною шкіркою, стійкий до фітофторозу листя та бульб, придатний для звичайного та органічного вирощування.

- » Хороша стійкість до синців
- » Підходить для варки та запікання
- » Хороша посухостійкість



Органічний продукт
Органічний



Переробка
Напівфабрикати



Торгові мережі
Свіжа



Традиційний



Характеристики

Загальні характеристики

Схрещування: AR 02-139-1 x LAURA

Сіянець: AR 04-3153

Характеристика рослин та бульб

Група стиглості: Середньостиглий / 6
 Колір паростків: Червоно-фіолетовий / RV
 Колір квітки: Світло-бузковий / LP
 Кількість ягід: Дуже висока / 4
 Початковий розвиток листя: Швидкий / 8
 Остаточний розвиток листової маси: Хороший / 8
 Щільність листя: Досить щільна / 7,5
 Можливість вибору листя: Середня / 6
 Колір шкірки: Червоний / R
 Колір м'якуша: Жовтий / 7,5
 Формування шкірки: Хороше / 7
 Форма бульби: Овально-видовжена / OL
 Рівномірність форми бульб: Рівномірна / 7
 Бульбоутворення: Середнє / 6
 Розмір бульби: Досить великий / 7
 Рівномірність розміру: Досить рівномірна / 6,5
 Період спокою: Середній / 6

Чутливість і якість

Вторинний ріст: Досить чутливий / 6,5
 Чорна пляма (внутрішній синець): Від малочутливого до нечутливого / 8
 Тріщини росту: Досить чутливий / 6,5
 Механічні пошкодження при збиранні: Досить чутливий / 6
 Метрибузин - досходове застосування: Малочутливий / 7,5
 Метрибузин - післясходовий: Малочутливий / 7
 Бентазон: Малочутливий / 7
 Етилен: на 5% менше бульб / 4
 Питома вага: 389
 Вміст сухої речовини: 21,1%
 Кулінарний тип: Слаборозваристий, тип АВ / АВ
 Зміна кольору після приготування: Малочутливий / 7
 Знебарвлення сирого матеріалу: Малочутливий / 7
 Придатність для смаження: Вище середнього / 6,5
 TGA-рівень: 3,6


www.agrico.com.ua

Рекомендації щодо вирощування

Система удобрення та обробка насіння ¹

Азот: до стандартної норми +10%

Фосфат: стандартна норма

Калій: до стандартної норми +20%

Обробка насіння

Бульби бажано висаджувати в теплий ґрунт, оскільки початковий розвиток цього сорту відбувається повільно. Достане попереднє пророщування після видалення верхнього паростка може дати позитивний результат на кількість ініційованих бульб. Обламування паростків більше одного разу може мати негативний вплив на врожайність і вирівняність бульб.

Відстань між рослинами

¹ Рівень удобрення, що ґрунтується на результатах аналізу ґрунту

28/35 мм: 20 см (67.000 кущів/га)

35/55 мм: 25 см (54.000 кущів/га)

Бур'яни

Після появи сходів стандартне застосування метрибузину (Зенкор) не викликає реакції листя або зниження врожайності.

Фунгіциди

Незважаючи на стійкість до фітофторозу, зберігайте пильність щодо інфекцій.

Врожай

Через чутливість до чорних плям та/або пошкодження врожаю слід зачекати щонайменше два тижні після знищення бадилля до збирання врожаю.

Температура зберігання - Тривалість зберігання

Рекомендована температура зберігання 5 °C. З метою переробки не зберігати при температурі нижче 7 °C. Підходить для середньострокового



Say potato,
say Agrico.

Стійкість

Вірус - Yn: Від трохи до зовсім не вразливий / 8

Вірус - Yntn (бульба): Трохи вразливий / 7

Віруси Моп-топ і Тютюнової мозаїки: Вразливий / 5,5

Фітофтороз листя: Від трохи до зовсім не вразливий / 9

Фітофтороз бульби: Від трохи до зовсім не вразливий / 9

Фузаріоз: Трохи вразливий / 7,5

Парша звичайна: Трохи вразливий / 6

Порошиста парша: Трохи вразливий / 6,5

Вірус - X: Трохи вразливий / 7

Рак картоплі F1: Стійкий / 10

Золотиста нематода Ro 1/4: Стійкий / 9

Золотиста нематода Ro 2/3: Польова стійкість / 8