

Дрізона.



Традиційний

Середньоранній столовий сорт, що дає високі врожаї в різних кліматичних умовах.

- » Рівномірна форма та розмір бульб
- » Хороша посухостійкість
- » Множинна стійкість до вірусів



Характеристики

Загальні характеристики

Схрещування: UK 150-19D22 x MASCOTTE

Сіянець: AR 98-0313

Характеристика рослин та бульб

Група стиглості: Середньоранній / 6,5

Колір паростків: Червоно-фіолетовий / RV

Колір квітки: Білий / W

Кількість ягід: Вище середньої / 5

Початковий розвиток листя: Досить швидкий / 7

Остаточний розвиток листової маси: Хороший / 8

Щільність листя: Середня / 6

Можливість вибору листя: Середня / 6,5

Колір шкірки: Жовтий / Y

Колір м'якуша: Світло-жовтий / 6

Формування шкірки: Хороше / 7

Форма бульби: Овальна / O

Рівномірність форми бульб: Рівномірна / 7,5

Бульбоутворення: Середнє / 6

Розмір бульби: Великий / 8

Рівномірність розміру: Рівномірна / 7

Період спокою: Середній / 6

Чутливість і якість

Вторинний ріст: Малочутливий / 7

Чорна пляма (внутрішній синець): Малочутливий / 7

Тріщини росту: Малочутливий / 7

Механічні пошкодження при збиранні: Малочутливий / 7

Метрибузин - досходове застосування: Чутливий / 5

Метрибузин - післясходовий: Досить чутливий / 6,5

Бентазон: Малочутливий / 7

Етилен: від 15% до 25% більше бульб / 7

Питома вага: 301

Вміст сухої речовини: 17%

Кулінарний тип: Слаборозваристий, тип АВ / АВ

Зміна кольору після приготування: Досить чутливий / 6,5

Придатність для смаження: Непридатний / 4

Придатність для переробки на чіпсів: Непридатний / 4

TGA-рівень: 4,2


www.agrico.com.ua

Рекомендації щодо вирощування

Система удобрення та обробка насіння ¹

Азот: від стандартної норми -10%

Фосфат: стандартна норма

Калій: стандартна норма

Обробка насіння

Обламування паростків більше одного разу може мати негативний вплив на врожайність і вирівняність бульб.

Відстань між рослинами

28/35 мм: 27 см (50.000 кущів/га)

35/55 мм: 30 см (45.000 кущів/га)

¹ Рівень удобрення, що ґрунтується на результатах аналізу ґрунту

Бур'яни

Після появи сходів не використовуйте метрибузин (Зенкор), оскільки він викликає сильну реакцію листя та значне зниження врожайності.

Фунгіциди

Необхідний суворий профілактичний графік обприскування проти фітофторозу.

Врожай

Через чутливість до чорних плям та/або пошкодження врожаю слід зачекати щонайменше два тижні після знищення бадилля до збирання врожаю.

Температура зберігання - Тривалість зберігання

Рекомендована температура зберігання 4 °C. Підходить для середньострокового зберігання.



Say potato,
say **Agrico.**

Стійкість

Вірус - Yn: Від трохи до зовсім не вразливий / 8

Вірус - Yntn (бульба): Від трохи до зовсім не вразливий / 8

Віруси Моп-топ і Тютюнової мозаїки: Вразливий / 5

Фітофтороз листя: Дуже вразливий / 4

Фітофтороз бульби: Вразливий / 5

Фузаріоз: Трохи вразливий / 6

Парша звичайна: Вразливий / 5,5

Порошиста парша: Дуже вразливий / 2

Вірус - X: Від трохи до зовсім не вразливий / 8

Чорна пляма: Дуже вразливий / 4

Ервінія (чорна ніжка): Трохи вразливий / 6

Рак картоплі F1: Стійкий / 10

Рак картоплі F6: Досить вразливий / 6

Золотиста нематода Ro 1/4: Стійкий / 9