

Арсенал.



Переробка
Чіпси
Пластівці

Середньостиглий, чіпсовий сорт з високою стійкістю до картопляної цистоутворюючої нематоди та хорошою врожайністю.

- **Множинна резистентність**
- **Підходить для чіпсів і пластівців**
- **Високий вміст сухої речовини**



characteristics

Загальні характеристики

Схрещування: AR 92-1146 x SILVESTER

Сіянець: AR 98-0851

Характеристика рослин та бульб

Група стиглості: Середньостиглий / 5,5

Колір паростків: Синьо-фіолетовий / BV

Колір квітки: Білий / W

Кількість ягід: Дуже висока / 4

Початковий розвиток листя: Середній / 6,5

Остаточний розвиток листової маси: Середній / 7

Щільність листя: Досить щільна / 7

Можливість вибору листя: Середня / 6,5

Колір шкірки: Жовтий / Y

Колір м'якуша: Світло-жовтий / 6

Формування шкірки: Досить повільне / 5

Форма бульби: Округло-овальна / RO

Рівномірність форми бульб: Досить рівномірна / 6,5

Бульбоутворення: Досить високе / 7

Розмір бульби: Досить великий / 7

Рівномірність розміру: Досить рівномірна / 6,5

Період спокою: Досить короткий / 5

Чутливість і якість

Вторинний ріст: Малочутливий / 7

Чорна пляма (внутрішній синець): Досить чутливий / 6

Тріщини росту: Чутливий / 5

Механічні пошкодження при збиранні:
Малочутливий / 7

Метрибузин - досходове застосування:
Малочутливий / 7,5

Метрибузин - післясходовий: Малочутливий / 7,5

Бентазон: Малочутливий / 7,5

Питома вага: 447

Вміст сухої речовини: 24%

Кулінарний тип: Розваристий, тип BC / BC

Зміна кольору після приготування: Досить чутливий / 6

Знебарвлення сирого матеріалу: Досить чутливий / 6,5

Придатність для смаження: Дуже хороший / 7,5

Розподіл сухої речовини: Хороший / 7,5

Придатність для переробки на чіпсів: Хороший / 7

TGA-рівень: 4,1


www.agrico.com.ua

How to grow

Система удобрення та обробка насіння ¹

Азот: від стандартної норми -20%

Фосфат: стандартна норма

Калій: до стандартної норми +10%

Обробка насіння

Достане попереднє пророщування після видалення верхнього паростка може дати позитивний результат на кількість ініційованих бульб. Обламування паростків більше одного разу може мати негативний вплив на врожайність і вирівняність бульб.

Planting distance

28/35 мм: 25 см (54.000 кущів/га)

35/50 мм: 30 см (45.000 кущів/га)

¹ Рівень удобрення, що ґрунтується на результатах аналізу ґрунту

Бур'яни

Після появи сходів стандартне застосування метрибузину (Зенкор) може викликати певну реакцію листя, але рідко призводить до зниження врожайності.

Фунгіциди

Необхідний суворий профілактичний графік обприскування проти фітофторозу.

Врожай

Через чутливість до чорних плям та/або пошкодження врожаю слід зачекати щонайменше два тижні після знищення бадилля до збирання врожаю.

Температура зберігання - Тривалість зберігання

З метою переробки не зберігати при температурі нижче 9 °C. Підходить для середньострокового зберігання.



Say potato,
say **Agrico.**

Стійкість

Вірус - Yn: Від трохи до зовсім не вразливий / 8

Вірус - Yntn (бульба): Трохи вразливий / 6,5

Віруси Моп-топ і Тютюнової мозаїки: Трохи вразливий / 7

Фітофтороз листя: Дуже вразливий / 4,5

Фітофтороз бульби: Вразливий / 5,5

Фузаріоз: Вразливий / 5

Парша звичайна: Вразливий / 5

Порошиста парша: Від трохи до зовсім не вразливий / 8

Вірус - X: Трохи вразливий / 7

Ервінія (чорна ніжка): Трохи вразливий / 7

Рак картоплі F1: Стійкий / 10

Золотиста нематода Ro 1/4: Стійкий / 9

Золотиста нематода Ro 2/3: Польова стійкість / 8

Біла нематода Pa 2: Стійкий / 9

Біла нематода Pa 3: Польова стійкість / 8