

Констанс.

Середньоранній столовий сорт з яскраво-жовтою шкіркою та світло-жовтим кольором м'якоті.



**Торгові
мережі**
Свіжа



Традиційний

- » Привабливий зовнішній вигляд
- » Однорідні бульби
- » Слабо розварюється



characteristics

Загальні характеристики

Схрещування: MARABEL x AR 93-1243

Сіянець: SA 02-0020

Характеристика рослин та бульб

Група стиглості: Середньоранній / 7

Колір паростків: Синьо-фіолетовий / BV

Колір квітки: Білий / W

Кількість ягід: Середня / 6

Початковий розвиток листя: Досить швидкий / 7

Остаточний розвиток листової маси: Хороший / 8

Щільність листя: Досить щільна / 7

Можливість вибору листя: Середня / 6,5

Колір шкірки: Жовтий / Y

Колір м'якуша: Світло-жовтий / 6,5

Формування шкірки: Відмінне / 8

Форма бульби: Овально-округла / OR

Рівномірність форми бульб: Рівномірна / 7

Бульбоутворення: Середнє / 6

Розмір бульби: Досить великий / 7

Рівномірність розміру: Рівномірна / 7

Період спокою: Середній / 6,5

Чутливість і якість

Вторинний ріст: Малочутливий / 7

Чорна пляма (внутрішній синець): Від малочутливого до нечутливого / 8

Тріщини росту: Малочутливий / 7

Механічні пошкодження при збиранні: Дуже чутливий / 4,5

Метрибузин - досходове застосування: Малочутливий / 7

Метрибузин - післясходовий: Малочутливий / 7,5

Бентазон: Від малочутливого до нечутливого / 8

Етилен: від 15% до 25% більше бульб / 7

Питома вага: 358

Вміст сухої речовини: 19,7%

Кулінарний тип: Слаборозваристий, тип АВ / АВ

Зміна кольору після приготування: Досить чутливий / 6,5

Знебарвлення сирого матеріалу: Досить чутливий / 6,5

Придатність для смаження: Нижче середнього / 5,5

Придатність для переробки на чіпсів: Непридатний / 4

TGA-рівень: 4,3


www.agrico.com.ua

How to grow

Система удобрення та обробка насіння ¹

Азот: до стандартної норми +15%

Фосфат: стандартна норма

Калій: до стандартної норми +15%

Обробка насіння

Достане попереднє пророщування після видалення верхнього паростка може дати позитивний результат на кількість ініційованих бульб. Обламування паростків більше одного разу може мати негативний вплив на врожайність і вирівняність бульб.

Planting distance

28/35 мм: 27 см (50.000 кущів/га)

35/55 мм: 36 см (37.000 кущів/га)

¹ Рівень удобрення, що ґрунтується на результатах аналізу ґрунту

Бур'яни

Після появи сходів стандартне застосування метрибузину (Зенкор) може викликати певну реакцію листя, але рідко призводить до зниження врожайності.

Фунгіциди

Необхідний суворий профілактичний графік обприскування проти фітофторозу.

Врожай

Через чутливість до чорних плям та/або пошкодження врожаю слід зачекати щонайменше два тижні після знищення бадилля до збирання врожаю.

Температура зберігання - Тривалість зберігання

Рекомендована температура зберігання 5 °C. Підходить для середньострокового зберігання.



Say potato,
say **Agrico.**

Стійкість

Вірус - Yn: Від трохи до зовсім не вразливий / 8

Вірус - Yntn (бульба): Трохи вразливий / 6,5

Віруси Моп-топ і Тютюнової мозаїки: Трохи вразливий / 6

Фітофтороз листя: Вразливий / 5

Фітофтороз бульби: Дуже вразливий / 4,5

Фузаріоз: Трохи вразливий / 6,5

Парша звичайна: Трохи вразливий / 6

Порошиста парша: Дуже вразливий / 3

Вірус - X: Трохи вразливий / 7

Чорна пляма: Трохи вразливий / 7

Ервінія (чорна ніжка): Трохи вразливий / 6