

Коразон.

Середньоранній високоврожайний столовий сорт з привабливою червоною шкіркою.




**Торгові
мережі**
Свіжа



Традиційний

- » **Відмінна якість шкірки**
- » **Слаборозваристий**
- » **Множинна резистентність**



characteristics

Загальні характеристики

Схрещування: EVOLUTION x MANITOU

Сіянець: SW 07-1082

Характеристика рослин та бульб

Група стиглості: Середньоранній / 7
 Колір паростків: Червоний / R
 Колір квітки: Світло-бузковий / LP
 Кількість ягід: Дуже висока / 4
 Початковий розвиток листя: Досить швидкий / 7,5
 Остаточний розвиток листової маси: Хороший / 8
 Щільність листя: Досить щільна / 7
 Можливість вибору листя: Досить легка / 7
 Колір шкірки: Червоний / R
 Колір м'якуша: Світло-жовтий / 6
 Формування шкірки: Хороше / 7
 Форма бульби: Овально-видовжена / OL
 Рівномірність форми бульб: Рівномірна / 7
 Бульбоутворення: Досить високе / 7
 Розмір бульби: Досить великий / 7
 Рівномірність розміру: Досить рівномірна / 6
 Період спокою: Досить короткий / 5,5

Чутливість і якість

Вторинний ріст: Досить чутливий / 6
 Чорна пляма (внутрішній синець): Малочутливий / 7,5
 Тріщини росту: Малочутливий / 7
 Механічні пошкодження при збиранні: Малочутливий / 7
 Метрибузин - досходове застосування: Малочутливий / 7
 Метрибузин - післясходовий: Дуже чутливий / 4
 Бентазон: Малочутливий / 7
 Етилен: від 5% до 15% більше бульб / 6
 Питома вага: 321
 Вміст сухої речовини: 17,8%
 Кулінарний тип: Слаборозваристий, тип АВ / АВ
 Зміна кольору після приготування: Досить чутливий / 6
 Придатність для смаження: Нижче середнього / 5,5
 Придатність для переробки на чіпсів: Непридатний / 4
 TGA-рівень: 10


www.agrico.com.ua

How to grow

Система удобрення та обробка насіння ¹

Азот: до стандартної норми +10%

Фосфат: стандартна норма

Калій: стандартна норма

Обробка насіння

Достане попереднє пророщування після видалення верхнього паростка може дати позитивний результат на кількість ініційованих бульб. Обламування паростків більше одного разу може мати негативний вплив на врожайність і вирівняність бульб.

Planting distance

28/35 мм: 27 см (50.000 кущів/га)

35/55 мм: 33 см (40.000 кущів/га)

¹ Рівень удобрення, що ґрунтується на результатах аналізу ґрунту

Бур'яни

Після появи сходів стандартне застосування метрибузину (Зенкор) може викликати певну реакцію листя, але рідко призводить до зниження врожайності.

Фунгіциди

Необхідний суворий профілактичний графік обприскування проти фітофторозу.

Врожай

Через чутливість до чорних плям та/або пошкодження врожаю слід зачекати щонайменше два тижні після знищення бадилля до збирання врожаю.

Температура зберігання - Тривалість зберігання

Рекомендована температура зберігання 4 °C. Підходить для середньо- та довгострокового зберігання.



Say potato,
say **Agrico.**

Стійкість

Вірус - Yn: Вразливий / 5,5

Вірус - Yntn (бульба): Від трохи до зовсім не вразливий / 8,5

Віруси Моп-топ і Тютюнової мозаїки: Вразливий / 5,5

Фітофтороз листя: Дуже вразливий / 4,5

Фітофтороз бульби: Трохи вразливий / 6,5

Фузаріоз: Вразливий / 5,5

Парша звичайна: Трохи вразливий / 6

Порошиста парша: Дуже вразливий / 4,5

Чорна пляма: Трохи вразливий / 7,5

Рак картоплі F1: Стійкий / 10

Рак картоплі F6: Слабо вразливий / 9

Золотиста нематода Ro 1/4: Стійкий / 9

Золотиста нематода Ro 2/3: Стійкий / 9