

ЕСМІ.

Середньоранній високоврожайний столовий сорт з гарною червоною шкіркою та високим рівнем посухостійкості.



**Торгові
мережі**
Свіжа



Традиційний

- **Привабливий зовнішній вигляд**
- **Великі бульби**
- **Множинна стійкість до вірусів**



Характеристики

Загальні характеристики

Схрещування: LAURA x RODEO

Сіянець: AR 01-0410

Характеристика рослин та бульб

Група стиглості: Середньоранній / 6,5

Колір паростків: Червоно-фіолетовий / RV

Колір квітки: Світло-бузковий / LP

Кількість ягід: Дуже висока / 4

Початковий розвиток листя: Досить швидкий / 7

Остаточний розвиток листової маси: Доволі хороший / 7,5

Щільність листя: Досить щільна / 7

Можливість вибору листя: Досить легка / 7

Колір шкірки: Червоний / R

Колір м'якуша: Жовтий / 7

Формування шкірки: Відмінне / 8

Форма бульби: Овально-видовжена / OL

Рівномірність форми бульб: Досить рівномірна / 6,5

Бульбоутворення: Середнє / 6

Розмір бульби: Великий / 8

Рівномірність розміру: Рівномірна / 7

Період спокою: Середній / 6

Чутливість і якість

Вторинний ріст: Досить чутливий / 6,5

Чорна пляма (внутрішній синець): Від малочутливого до нечутливого / 8

Тріщини росту: Досить чутливий / 6

Механічні пошкодження при збиранні: Досить чутливий / 6,5

Метрибузин - досходове застосування: Дуже чутливий / 4

Метрибузин - післясходовий: Малочутливий / 7

Бентазон: Малочутливий / 7

Етилен: від 5% менше до 5% більше бульб / 5

Питома вага: 326

Вміст сухої речовини: 18%

Кулінарний тип: Слаборозваристий, тип АВ / АВ

Зміна кольору після приготування: Чутливий / 5,5

Знебарвлення сирого матеріалу: Досить чутливий / 6

Придатність для смаження: Середній / 6

Придатність для переробки на чіпсів: Непридатний / 4

TGA-рівень: 8,2


www.agrico.com.ua

Рекомендації щодо вирощування

Система удобрення та обробка насіння ¹

Азот: до стандартної норми +10%

Фосфат: стандартна норма

Калій: стандартна норма

Обробка насіння

Можна висаджувати безпосередньо з холодильної камери, бажано після короткого теплового шоку. Обламування паростків може мати негативний вплив на врожайність і вирівняність бульб.

Відстань між рослинами

28/35 мм: 25 см (54.000 кущів/га)

35/55 мм: 30 см (45.000 кущів/га)

¹ Рівень удобрення, що ґрунтується на результатах аналізу ґрунту

Бур'яни

Після появи сходів не використовуйте метрибузин (Зенкор), оскільки він викликає сильну реакцію листя та значне зниження врожайності.

Фунгіциди

Необхідний суворий профілактичний графік обприскування проти фітофторозу.

Врожай

Через чутливість до чорних плям та/або пошкодження врожаю слід зачекати щонайменше два тижні після знищення бадилля до збирання врожаю.

Температура зберігання - Тривалість зберігання

Рекомендована температура зберігання 5 °C. Підходить для середньострокового зберігання.



Say potato,
say **Agrico.**

Стійкість

Вірус - Yn: Від трохи до зовсім не вразливий / 8

Вірус - Yntn (бульба): Трохи вразливий / 7

Віруси Моп-топ і Тютюнової мозаїки: Дуже вразливий / 4

Фітофтороз листя: Дуже вразливий / 4,5

Фітофтороз бульби: Трохи вразливий / 7

Фузаріоз: Трохи вразливий / 7

Парша звичайна: Трохи вразливий / 6

Порошиста парша: Трохи вразливий / 6,5

Вірус - X: Від трохи до зовсім не вразливий / 8

Чорна пляма: Вразливий / 5,5

Ервінія (чорна ніжка): Трохи вразливий / 7

Рак картоплі F1: Стійкий / 10