

Фонтане.

Універсальний високоврожайний середньостиглий сорт для поглибленої промислової переробки на картоплю фрі та пластівці.



Переробка
Картопля фрі
Чіпси
Пластівці

- Великі бульби
- Високий вміст сухої речовини
- Підходить для різних типів ґрунту



the
ORIGINAL

Характеристики

Загальні характеристики

Схрещування: AGRIA x AR 76-034-03

Сіянець: SW 87-1140

Характеристика рослин та бульб

Група стиглості: Середньостиглий / 5,5

Колір паростків: Синьо-фіолетовий / BV

Колір квітки: Білий / W

Кількість ягід: Вище середньої / 5

Початковий розвиток листя: Досить швидкий / 7,5

Остаточний розвиток листової маси: Середній / 7

Щільність листя: Досить щільна / 7

Можливість вибору листя: Середня / 6

Колір шкірки: Жовтий / Y

Колір м'якуша: Світло-жовтий / 6,5

Формування шкірки: Досить повільне / 5

Форма бульби: Овальна / O

Рівномірність форми бульб: Досить рівномірна / 6,5

Бульбоутворення: Досить високе / 7

Розмір бульби: Досить великий / 7

Рівномірність розміру: Досить рівномірна / 6

Період спокою: Досить короткий / 5,5

Чутливість і якість

Вторинний ріст: Досить чутливий / 6

Чорна пляма (внутрішній синець): Досить чутливий / 6

Тріщини росту: Досить чутливий / 6

Механічні пошкодження при збиранні: Досить чутливий / 6

Метрибузин - досходове застосування: Від малочутливого до нечутливого / 8

Метрибузин - післясходовий: Від малочутливого до нечутливого / 8

Бентазон: Досить чутливий / 6

Етилен: від 15% до 25% більше бульб / 7

Питома вага: 430

Вміст сухої речовини: 23,2%

Кулінарний тип: Розваристий, тип BC / BC

Зміна кольору після приготування: Досить чутливий / 6,5

Знебарвлення сирого матеріалу: Чутливий / 5,5

Придатність для смаження: Дуже хороший / 7,5

Розподіл сухої речовини: Середній / 6,5

Придатність для переробки на чіпсів: Середній / 6

TGA-рівень: 6,1


www.agrico.com.ua

Рекомендації щодо вирощування

Система удобрення та обробка насіння ¹

Азот: до стандартної норми +30% Можна використовувати органічні добрива.

Фосфат: стандартна норма

Калій: до стандартної норми +10%

Обробка насіння

Можна висаджувати безпосередньо з холодильної камери, бажано після короткого теплового шоку. Обламування паростків більше двох разів може мати негативний вплив на врожайність і вирівняність бульб.

Відстань між рослинами

28/35 мм: 27 см (50.000 кущів/га)

35/55 мм: 33 см (40.000 кущів/га)

50/55 мм: 40 см (33.000 кущів/га)

¹ Рівень удобрення, що ґрунтується на результатах аналізу ґрунту

Бур'яни

Після появи сходів стандартне застосування метрибузину (Зенкор) не викликає реакції листя або зниження врожайності.

Фунгіциди

Необхідний суворий профілактичний графік обприскування проти фітофторозу.

Врожай

Через чутливість до чорних плям та/або пошкодження врожаю слід зачекати щонайменше два тижні після знищення бадилля до збирання врожаю.

Температура зберігання - Тривалість зберігання

Рекомендована температура зберігання 5 °C. З метою переробки не зберігати при температурі нижче 7 °C. Підходить для тривалого зберігання.



Say potato,
say **Agrico.**

Стійкість

Вірус скручування листя: Трохи вразливий / 6

Вірус - Yn: Вразливий / 5,5

Вірус - Yntn (бульба): Трохи вразливий / 7

Віруси Моп-топ і Тютюнової мозаїки: Трохи вразливий / 6,5

Фітофтороз листя: Вразливий / 5

Фітофтороз бульби: Трохи вразливий / 6,5

Фузаріоз: Трохи вразливий / 6

Парша звичайна: Трохи вразливий / 6

Порошиста парша: Трохи вразливий / 6

Вірус - X: Трохи вразливий / 7

Ервінія (чорна ніжка): Трохи вразливий / 6

Рак картоплі F1: Досить вразливий / 6

Рак картоплі F6: Помірно вразливий / 8

Золотиста нематода Ro 1/4: Стійкий / 9