

Джолін.

Середньостиглий сорт з привабливою шкіркою та придатний для домашнього смаження.




**Торгові
мережі**
Свіжа



Традиційний

- » **Світло-жовтий м'якуш**
- » **Підходить для приготування різних страв**
- » **Хороший вміст сухої речовини**



Характеристики

Загальні характеристики

Схрещування: SAGITTA x AR 03-1491

Сіянець: AR 09-2556

Характеристика рослин та бульб

Група стиглості: Середньостиглий / 6

Колір паростків: Червоний / R

Колір квітки: Білий / W

Кількість ягід: Нижче середньої / 7

Початковий розвиток листя: Досить швидкий / 7,5

Остаточний розвиток листової маси: Хороший / 8

Щільність листя: Досить щільна / 7,5

Можливість вибору листя: Середня / 6

Колір шкірки: Жовтий / Y

Колір м'якуша: Світло-жовтий / 6

Формування шкірки: Хороше / 7

Форма бульби: Овально-видовжена / OL

Рівномірність форми бульб: Рівномірна / 7

Бульбоутворення: Досить високе / 7

Розмір бульби: Досить великий / 7,5

Рівномірність розміру: Рівномірна / 7

Період спокою: Середній / 6

Чутливість і якість

Вторинний ріст: Малочутливий / 7

Чорна пляма (внутрішній синець): Малочутливий / 7

Тріщини росту: Малочутливий / 7

Механічні пошкодження при збиранні: Досить чутливий / 6

Метрибузин - досходове застосування: Досить чутливий / 6,5

Метрибузин - післясходовий: Від малочутливого до нечутливого / 8

Етилен: від 15% до 25% більше бульб / 7

Питома вага: 389

Вміст сухої речовини: 21,1%

Кулінарний тип: Досить розваристий, тип B / B

Зміна кольору після приготування: Досить чутливий / 6,5

Знебарвлення сирого матеріалу: Малочутливий / 7

Придатність для смаження: Хороший / 7

Придатність для переробки на чіпсів: Непридатний / 5

TGA-рівень: 6,9


www.agrico.com.ua

Рекомендації щодо вирощування

Система удобрення та обробка насіння ¹

Азот: стандартна норма

Фосфат: стандартна норма

Калій: до стандартної норми +10%

Обробка насіння

Можна висаджувати безпосередньо з холодильної камери, бажано після короткого теплового шоку. Обламування паростків більше одного разу може мати негативний вплив на врожайність і вирівняність бульб.

Відстань між рослинами

28/35 мм: 22 см (60.500 кущів/га)

35/55 мм: 25 см (54.000 кущів/га)

¹ Рівень удобрення, що ґрунтується на результатах аналізу ґрунту

Бур'яни

Після появи сходів стандартне застосування метрибузину (Зенкор) може спричинити певну реакцію листя та деяке зниження врожайності.

Фунгіциди

Необхідний суворий профілактичний графік обприскування проти фітофторозу.

Врожай

Через чутливість до чорних плям та/або пошкодження врожаю слід зачекати щонайменше два тижні після знищення бадилля до збирання врожаю.

Температура зберігання - Тривалість зберігання

Рекомендована температура зберігання 5 °C. Підходить для середньострокового зберігання.



Say potato,
say **Agrico.**

Стійкість

Вірус - Yn: Від трохи до зовсім не вразливий / 8

Вірус - Yntn (бульба): Від трохи до зовсім не вразливий / 8

Віруси Моп-топ і Тютюнової мозаїки: Трохи вразливий / 6

Фітофтороз листя: Дуже вразливий / 4

Фітофтороз бульби: Вразливий / 5

Фузаріоз: Трохи вразливий / 6

Парша звичайна: Трохи вразливий / 6

Порошиста парша: Трохи вразливий / 6,5

Чорна пляма: Трохи вразливий / 7,5