РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИРОЩУВАННЮ

Наполеон.

Середньопізній сорт з бульбами однорідного розміру та високим вмістом сухої речовини, підходить для переробки на чіпси.

- **Хороша придатність для переробки на чіпси**
- **Підходить для переробки на пластівці.**
- **Хороша стійкість до вірусів**

Переробка
Чіпси
Пластівці



Характеристики

Загальні характеристики

Схрещування: ANTINA x ALICANTE

Сіянець: AR 10-4637

Характеристика рослин та бульб

Група стиглості: Середньопізній / 5

Колір паростків: Червоно-фіолетовий / RV

Колір квітки: Білий / W

Кількість ягід: Дуже висока / 4

Початковий розвиток листя: Досить швидкий / 7

Остаточний розвиток листової маси: Хороший / 8

Щільність листя: Досить щільна / 7,5

Можливість вибору листя: Середня / 6,5

Колір шкірки: Жовтий / Y

Колір м'якуша: Світло-жовтий / 6,5

Формування шкірки: Досить повільне / 5

Форма бульби: Округло-овальна / RO

Рівномірність форми бульб: Рівномірна / 7

Бульбоутворення: Середнє / 6

Розмір бульби: Досить великий / 7,5

Рівномірність розміру: Рівномірна / 7

Період спокою: Середній / 6

Чутливість і якість

Вторинний ріст: Досить чутливий / 6,5

Чорна пляма (внутрішній синець): Чутливий / 5,5

Тріщини росту: Досить чутливий / 6

Механічні пошкодження при збиранні: Досить чутливий / 6,5

Метрибузин - досходове застосування: Малочутливий / 7

Метрибузин - післясходовий: Малочутливий / 7

Етилен: від 5% менше до 5% більше бульб / 5

Питома вага: 450

Вміст сухої речовини: 24,1%

Кулінарний тип: Розваристий, тип ВС / ВС

Зміна кольору після приготування: Досить чутливий / 6

Знебарвлення сирого матеріалу: Досить чутливий / 6

Придатність для смаження: Хороший / 7

Розподіл сухої речовини: Хороший / 7

Придатність для переробки на чіпсів: Відмінний / 8

TGA-рівень: 4,0

Компанія Агріко приділяла всю необхідну увагу при підготовці цього опису сорту. Проте, звертаємо вашу увагу на те, що будь-яка інформація може бути предметом змін, і компанія Агріко не несе відповідальності за помилки або пропуски. За жодних обставин компанія Агріко не несе відповідальності за збитки, що виникають внаслідок або пов'язані з інформацією, що міститься у цьому описі.

AGRICO | UKRAINE

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИРОЩУВАННЮ

Рекомендації щодо вирощування

www.agrico.com.ua

Система удобрення та обробка насіння [1]

Азот: від стандартної норми -10%

Фосфат: стандартна норма

Калій: до стандартної норми +20%

Обробка насіння

Достанє попереднє пророщування після видалення верхнього паростка може дати позитивний результат на кількість ініційованих бульб.

Відстань між рослинами

28/35 мм: 25 cm (54.000 кущів/га)

35/55 мм: 30 cm (45.000 кущів/га)

50/55 мм: 40 cm (33.000 кущів/га)

[1] Рівень удобрення, що грунтується на результатах аналізу грунту

Бур'яни

Після появи сходів стандартне застосування метрибузину (Зенкор) не викликає реакції листя або зниження врожайності.

Фунгіциди

Рекомендується профілактичний графік обприскування проти фітофторозу.

Врожай

Через чутливість до чорних плям та/або пошкодження врожаю слід зачекати щонайменше два тижні після знищення бадилля до збирання врожаю.

Температура зберігання - Тривалість зберігання

З метою переробки не зберігати при температурі нижче 9 °C. Підходить для середньо- та довгострокового зберігання.



Say potato, say Agrico.

Стійкість

Вірус - Yn: Від трохи до зовсім не вразливий / 8

Вірус - Yntn (бульба): Від трохи до зовсім не вразливий / 8

Віруси Моп-топ і Тютюнової мозаїки: Вразливий / 5

Фітофтороз листя: Трохи вразливий / 6

Фітофтороз бульби: Трохи вразливий / 6,5

Фузаріоз: Трохи вразливий / 6,5

Парша звичайна: Трохи вразливий / 6

Чорна пляма: Трохи вразливий / 6

Рак картоплі F1: Стійкий / 10

Золотиста нематода Ro 1/4: Стійкий / 9

Біла нематода Pa 2: Сприйнятливий / 4

Біла нематода Pa 3: Сприйнятливий / 2

Agrico Ukraine • Україна • 03150 • м. Київ, вул. Ковпака • буд. 3

+38 067 1000 454 • +38 099 1000 454 potato@agrico.com.ua www.agrico.com.ua

AGRICO | UKRAINE