


Парадізо.



Традиційний

Середньостиглий високоврожайний сорт, формує великі однорідні бульби, підходить для традиційного ринку.

- » Великі бульби
- » Привабливий зовнішній вигляд
- » Хороша стійкість до синців



Характеристики

Загальні характеристики

Схрещування: RODEO x VALOR

Сіянець: PK 06-0108

Характеристика рослин та бульб

Група стиглості: Середньостиглий / 5,5

Колір паростків: Червоний / R

Колір квітки: Бузковий / P

Кількість ягід: Нижче середньої / 6,5

Початковий розвиток листя: Досить швидкий / 7,5

Остаточний розвиток листової маси: Доволі хороший / 7,5

Щільність листя: Досить щільна / 7

Можливість вибору листя: Досить легка / 7

Колір шкірки: Жовтий / Y

Колір м'якуша: Світло-жовтий / 6

Формування шкірки: Хороше / 7

Форма бульби: Овально-видовжена / OL

Рівномірність форми бульб: Досить рівномірна / 6,5

Бульбоутворення: Середнє / 6

Розмір бульби: Великий / 8

Рівномірність розміру: Досить рівномірна / 6,5

Період спокою: Середній / 6

Чутливість і якість

Вторинний ріст: Малочутливий / 7

Чорна пляма (внутрішній синець): Малочутливий / 7,5

Тріщини росту: Досить чутливий / 6,5

Механічні пошкодження при збиранні: Досить чутливий / 6,5

Метрибузин - досходове застосування: Від малочутливого до нечутливого / 8

Метрибузин - післясходовий: Досить чутливий / 6,5

Бентазон: Досить чутливий / 6,5

Етилен: від 5% до 15% більше бульб / 6

Питома вага: 329

Вміст сухої речовини: 18,2%

Кулінарний тип: Досить розваристий, тип B / B

Зміна кольору після приготування: Досить чутливий / 6,5

Придатність для смаження: Непридатний / 4,5

Придатність для переробки на чіпсів: Непридатний / 4

TGA-рівень: 4,8


www.agrico.com.ua

Рекомендації щодо вирощування

Система удобрення та обробка насіння ¹

Азот: від стандартної норми -20% Бажано у вигляді роздільного внесення, друга обробка незабаром після бульбоутворення.

Фосфат: стандартна норма

Калій: стандартна норма

Обробка насіння

Обламування паростків може мати негативний вплив на врожайність і вирівняність бульб.

Відстань між рослинами

28/35 мм: 23 см (65.500 кущів/га)

35/55 мм: 33 см (50.000 кущів/га)

¹ Рівень удобрення, що ґрунтується на результатах аналізу ґрунту

Бур'яни

Після появи сходів стандартне застосування метрибузину (Зенкор) не викликає реакції листя або зниження врожайності.

Фунгіциди

Рекомендується профілактичний графік обприскування проти фітофторозу.

Врожай

Через чутливість до чорних плям та/або пошкодження врожаю слід зачекати щонайменше два тижні після знищення бадилля до збирання врожаю.

Температура зберігання - Тривалість зберігання

Рекомендована температура зберігання 4 °C. Підходить для середньострокового зберігання.



Say potato,
say **Agrico.**

Стійкість

Вірус - Yn: Трохи вразливий / 6

Вірус - Yntn (бульба): Трохи вразливий / 7,5

Віруси Моп-топ і Тютюнової мозаїки: Дуже вразливий / 4

Фітофтороз листя: Вразливий / 5,5

Фітофтороз бульби: Трохи вразливий / 6,5

Фузаріоз: Вразливий / 5

Парша звичайна: Вразливий / 5,5

Порошиста парша: Трохи вразливий / 7,5

Чорна пляма: Вразливий / 5,5

Рак картоплі F1: Стійкий / 10

Золотиста нематода Ro 1/4: Стійкий / 9