РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИРОЩУВАННЮ

Пікассо.

Традиційний

Середньопізній сорт столового призначення, формує однорідні бульби з жовтою шкіркою та привабливим червоним забарвленням вічок, має високу стійкість до парші звичайної, придатний для тривалого зберігання.

- **Висока врожайність**
- **Висока посухостійкість**
- **Хороша стійкість до синців та механічних пошкоджень**

characteristics

Загальні характеристики

Схрещування: CARA x AUSONIA

Права селекціонерів: Закінчилися

Сіянець: HB 81-0036

Характеристика рослин та бульб

Група стиглості: Середньопізній / 5

Колір паростків: Червоно-фіолетовий / RV

Колір квітки: Білий / W

Кількість ягід: Дуже висока / 4

Початковий розвиток листя: Середній / 6,5

Остаточний розвиток листової маси: Хороший / 8

Щільність листя: Досить щільна / 7,5

Можливість вибору листя: Досить легка / 7

Колір шкірки: Жовтий з червоними вічками / Y/R

Колір м'якуша: Світло-жовтий / 6

Формування шкірки: Середнє / 6

Форма бульби: Овальна / O

Рівномірність форми бульб: Досить рівномірна / 6

Бульбоутворення: Середнє / 6

Розмір бульби: Великий / 8

Рівномірність розміру: Рівномірна / 7

Період спокою: Довгий / 8

Чутливість і якість

Вторинний ріст: Досить чутливий / 6,5

Чорна пляма (внутрішній синець): Малочутливий / 7

Тріщини росту: Досить чутливий / 6

Механічні пошкодження при збиранні: Досить чутливий / 6,5

Метрибузин - досходове застосування: Досить чутливий / 6

Метрибузин - післясходовий: Досить чутливий / 6

Етилен: від 5% менше до 5% більше бульб / 5

Питома вага: 381

Вміст сухої речовини: 20,8%

Кулінарний тип: Досить розваристий, тип B / B

Зміна кольору після приготування: Досить чутливий / 6,5

Придатність для смаження: Непридатний / 5

Придатність для переробки на чіпсів: Непридатний / 4

TGA-рівень: 1,9

Компанія Агріко приділяла всю необхідну увагу при підготовці цього опису сорту. Проте, звертаємо вашу увагу на те, що будь-яка інформація може бути предметом змін, і компанія Агріко не несе відповідальності за помилки або пропуски. За жодних обставин компанія Агріко не несе відповідальності за збитки, що виникають внаслідок або пов'язані з інформацією, що міститься у цьому описі.

AGRICO | UKRAINE

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИРОЩУВАННЮ

How to grow

www.agrico.com.ua

Система удобрення та обробка насіння [1]

Азот: до стандартної норми +5%
Фосфат: стандартна норма
Калій: стандартна норма

Обробка насіння

Достанє попереднє пророщування після видалення верхнього паростка може дати позитивний результат на кількість ініційованих бульб.Обламування паростків більше одного разу може мати негативний вплив на врожайність і вирівняність бульб.

Planting distance

28/35 мм: 27 cm (50.000 кущів/га)
35/55 мм: 33 cm (40.000 кущів/га)

[1] Рівень удобрення, що грунтується на результатах аналізу грунту

Бур'яни

Після появи сходів стандартне застосування метрибузину (Зенкор) може спричинити певну реакцію листя та деяке зниження врожайності.

Фунгіциди

Необхідний суворий профілактичний графік обприскування проти фітофторозу.

Врожай

Через чутливість до чорних плям та/або пошкодження врожаю слід зачекати щонайменше два тижні після знищення бадилля до збирання врожаю.

Температура зберігання - Тривалість зберігання

Рекомендована температура зберігання 4 °C. Підходить для тривалого зберігання.

Say potato, say Agrico.

Стійкість

Вірус скручування листя: Вразливий / 5
Вірус - Yn: Від трохи до зовсім не вразливий / 8
Вірус - Yntn (бульба): Вразливий / 5
Віруси Моп-топ і Тютюнової мозаїки: Вразливий / 5
Фітофтороз листя: Вразливий / 5
Фітофтороз бульби: Трохи вразливий / 7
Фузаріоз: Трохи вразливий / 7

Парша звичайна: Трохи вразливий / 7
Порошиста парша: Вразливий / 5
Вірус - X: Від трохи до зовсім не вразливий / 9
Ервінія (чорна ніжка): Вразливий / 5
Рак картоплі F1: Стійкий / 10
Рак картоплі F6: Досить вразливий / 5
Золотиста нематода Ro 1/4: Стійкий / 9

Agrico Ukraine • Україна • 03150 • м. Київ, вул. Ковпака • буд. 3
+38 067 1000 454 • +38 099 1000 454 potato@agrico.com.ua www.agrico.com.ua

AGRICO | UKRAINE