

# Пікассо.



Традиційний

Середньопізній сорт столового призначення, формує однорідні бульби з жовтою шкіркою та привабливим червоним забарвленням вічок, має високу стійкість до парші звичайної, придатний для тривалого зберігання.



- **Висока врожайність**
- **Висока посухостійкість**
- **Хороша стійкість до синців та механічних пошкоджень**

## characteristics

### Загальні характеристики

Схрещування: CARA x AUSONIA

Права селекціонерів: Закінчилися

Сіянець: HB 81-0036

### Характеристика рослин та бульб

Група стиглості: Середньопізній / 5

Колір паростків: Червоно-фіолетовий / RV

Колір квітки: Білий / W

Кількість ягід: Дуже висока / 4

Початковий розвиток листя: Середній / 6,5

Остаточний розвиток листової маси: Хороший / 8

Щільність листя: Досить щільна / 7,5

Можливість вибору листя: Досить легка / 7

Колір шкірки: Жовтий з червоними вічками / Y/R

Колір м'якуша: Світло-жовтий / 6

Формування шкірки: Середнє / 6

Форма бульби: Овальна / O

Рівномірність форми бульб: Досить рівномірна / 6

Бульбоутворення: Середнє / 6

Розмір бульби: Великий / 8

Рівномірність розміру: Рівномірна / 7

Період спокою: Довгий / 8

### Чутливість і якість

Вторинний ріст: Досить чутливий / 6,5

Чорна пляма (внутрішній синець): Малочутливий / 7

Тріщини росту: Досить чутливий / 6

Механічні пошкодження при збиранні: Досить чутливий / 6,5

Метрибузин - досходове застосування: Досить чутливий / 6

Метрибузин - післясходовий: Досить чутливий / 6

Етилен: від 5% менше до 5% більше бульб / 5

Питома вага: 381

Вміст сухої речовини: 20,8%

Кулінарний тип: Досить розваристий, тип B / B

Зміна кольору після приготування: Досить чутливий / 6,5

Придатність для смаження: Непридатний / 5

Придатність для переробки на чіпсів: Непридатний / 4

TGA-рівень: 1,9


[www.agrico.com.ua](http://www.agrico.com.ua)

# How to grow

## Система удобрення та обробка насіння <sup>1</sup>

Азот: до стандартної норми +5%

Фосфат: стандартна норма

Калій: стандартна норма

## Обробка насіння

Достане попереднє пророщування після видалення верхнього паростка може дати позитивний результат на кількість ініційованих бульб. Обламування паростків більше одного разу може мати негативний вплив на врожайність і вирівняність бульб.

## Planting distance

28/35 мм: 27 см (50.000 кущів/га)

35/55 мм: 33 см (40.000 кущів/га)

<sup>1</sup> Рівень удобрення, що ґрунтується на результатах аналізу ґрунту

## Бур'яни

Після появи сходів стандартне застосування метрибузину (Зенкор) може спричинити певну реакцію листя та деяке зниження врожайності.

## Фунгіциди

Необхідний суворий профілактичний графік обприскування проти фітофторозу.

## Врожай

Через чутливість до чорних плям та/або пошкодження врожаю слід зачекати щонайменше два тижні після знищення бадилля до збирання врожаю.

## Температура зберігання - Тривалість зберігання

Рекомендована температура зберігання 4 °C. Підходить для тривалого зберігання.



Say potato,  
say Agrico.

## Стійкість

Вірус скручування листя: Вразливий / 5

Вірус - Yn: Від трохи до зовсім не вразливий / 8

Вірус - Yntn (бульба): Вразливий / 5

Віруси Моп-топ і Тютюнової мозаїки: Вразливий / 5

Фітофтороз листя: Вразливий / 5

Фітофтороз бульби: Трохи вразливий / 7

Фузаріоз: Трохи вразливий / 7

Парша звичайна: Трохи вразливий / 7

Порошиста парша: Вразливий / 5

Вірус - X: Від трохи до зовсім не вразливий / 9

Ервінія (чорна ніжка): Вразливий / 5

Рак картоплі F1: Стійкий / 10

Рак картоплі F6: Досить вразливий / 5

Золотиста нематода Ro 1/4: Стійкий / 9