

Раномі.

Ранній столовий сорт з хорошою стійкістю до парші та ранньою врожайністю.




**Торгові
мережі**
Свіжа



Традиційний

- » Приваблива шкірка
- » Великі бульби
- » Слаборозваристий



characteristics

Загальні характеристики

Схрещування: AR 93-033-79 x AR 95-0319

Сіянець: AR 03-0221

Характеристика рослин та бульб

Група стиглості: Ранній / 7,5

Колір паростків: Червоно-фіолетовий / RV

Колір квітки: Білий / W

Кількість ягід: Середня / 6

Початковий розвиток листя: Досить швидкий / 7,5

Остаточний розвиток листової маси: Середній / 7

Щільність листя: Середня / 6,5

Можливість вибору листя: Середня / 6

Колір шкірки: Жовтий / Y

Колір м'якуша: Світло-жовтий / 6,5

Формування шкірки: Хороше / 7

Форма бульби: Овально-видовжена / OL

Рівномірність форми бульб: Рівномірна / 7

Бульбоутворення: Середнє / 6

Розмір бульби: Досить великий / 7

Рівномірність розміру: Рівномірна / 7

Період спокою: Середній / 6

Чутливість і якість

Вторинний ріст: Досить чутливий / 6

Чорна пляма (внутрішній синець): Від малочутливого до нечутливого / 8

Тріщини росту: Досить чутливий / 6,5

Механічні пошкодження при збиранні: Досить чутливий / 6

Метрибузин - досходове застосування: Чутливий / 5

Метрибузин - післясходовий: Досить чутливий / 6

Бентазон: Малочутливий / 7

Етилен: від 5% до 15% більше бульб / 6

Питома вага: 322

Вміст сухої речовини: 17,9%

Кулінарний тип: Слаборозваристий, тип АВ / АВ

Зміна кольору після приготування: Досить чутливий / 6

Придатність для смаження: Вище середнього / 6,5

Придатність для переробки на чіпсів: Непридатний / 5

TGA-рівень: 4,08


www.agrico.com.ua

How to grow

Система удобрення та обробка насіння ¹

Азот: стандартна норма Бажано у вигляді роздільного внесення, друга обробка незабаром після бульбоутворення.

Фосфат: стандартна норма

Калій: до стандартної норми +10%

Обробка насіння

Можна висаджувати безпосередньо з холодильної камери, бажано після короткого теплового шоку. Обламування паростків більше одного разу може мати негативний вплив на врожайність і вирівняність бульб.

Planting distance

28/35 мм: 25 см (54.000 кущів/га)

35/55 мм: 30 см (45.000 кущів/га)

¹ Рівень удобрення, що ґрунтується на результатах аналізу ґрунту

Бур'яни

Після появи сходів стандартне застосування метрибузину (Зенкор) може спричинити певну реакцію листя та деяке зниження врожайності.

Фунгіциди

Необхідний суворий профілактичний графік обприскування проти фітофторозу.

Врожай

Через чутливість до чорних плям та/або пошкодження врожаю слід зачекати щонайменше два тижні після знищення бадилля до збирання врожаю.

Температура зберігання - Тривалість зберігання

Рекомендована температура зберігання 4 °C. Підходить для постачання прямо з поля або короткострокового зберігання.



Say potato,
say Agrico.

Стійкість

Вірус - Yn: Вразливий / 5,5

Вірус - Yntn (бульба): Трохи вразливий / 6

Віруси Моп-топ і Тютюнової мозаїки: Трохи вразливий / 6,5

Фітофтороз листя: Дуже вразливий / 4

Фітофтороз бульби: Трохи вразливий / 6

Фузаріоз: Вразливий / 5

Парша звичайна: Трохи вразливий / 6,5

Порошиста парша: Дуже вразливий / 4,5

Вірус - X: Вразливий / 5,5

Чорна пляма: Трохи вразливий / 7

Рак картоплі F1: Стійкий / 10

Золотиста нематода Ro 1/4: Стійкий / 9