

Рів єра.



Традиційний

Надранній високоврожайний сорт столового призначення з привабливою шкіркою, стійкий до високих температур повітря та ґрунту та вірусів.

- Великі бульби
- Привабливий зовнішній вигляд
- Хороша стійкість до вірусів



Характеристики

Загальні характеристики

Схрещування: MINERVA x ALCMARIA

Сіянець: ВН 86-0266

Характеристика рослин та бульб

Група стиглості: Надранній / 8
 Колір паростків: Синьо-фіолетовий / BV
 Колір квітки: Білий / W
 Кількість ягід: Дуже висока / 4
 Початковий розвиток листя: Досить швидкий / 7
 Остаточний розвиток листової маси: Середній / 7
 Щільність листя: Середня / 6,5
 Можливість вибору листя: Середня / 6,5
 Колір шкірки: Жовтий / Y
 Колір м'якуша: Світло-жовтий / 6
 Формування шкірки: Відмінне / 8
 Форма бульби: Овально-округла / OR
 Рівномірність форми бульб: Досить рівномірна / 6
 Бульбоутворення: Досить низьке / 5
 Розмір бульби: Досить великий / 7,5
 Рівномірність розміру: Рівномірна / 7
 Період спокою: Середній / 6

Чутливість і якість

Вторинний ріст: Досить чутливий / 6,5
 Чорна пляма (внутрішній синець): Від малочутливого до нечутливого / 8
 Тріщини росту: Досить чутливий / 6,5
 Механічні пошкодження при збиранні: Досить чутливий / 6
 Метрибузин - досходове застосування: Від малочутливого до нечутливого / 8
 Метрибузин - післясходовий: Від малочутливого до нечутливого / 8
 Етилен: від 5% до 15% більше бульб / 6
 Питома вага: 318
 Вміст сухої речовини: 17,7%
 Кулінарний тип: Слаборозваристий, тип АВ / АВ
 Зміна кольору після приготування: Чутливий / 5,5
 Придатність для смаження: Непридатний / 4,5
 Придатність для переробки на чіпсів: Непридатний / 4
 TGA-рівень: 4,8


www.agrico.com.ua

Рекомендації щодо вирощування

Система удобрення та обробка насіння ¹

Азот: до стандартної норми +10%

Фосфат: стандартна норма

Калій: стандартна норма

Обробка насіння

Достане попереднє пророщування після видалення верхнього паростка може дати позитивний результат на кількість ініційованих бульб. Обламування паростків більше одного разу може мати негативний вплив на врожайність і вирівняність бульб.

Відстань між рослинами

28/35 мм: 22 см (60.500 кущів/га)

35/55 мм: 27 см (50.000 кущів/га)

¹ Рівень удобрення, що ґрунтується на результатах аналізу ґрунту

Бур'яни

Після появи сходів стандартне застосування метрибузину (Зенкор) не викликає реакції листя або зниження врожайності.

Фунгіциди

Необхідний суворий профілактичний графік обприскування проти фітофторозу.

Врожай

Через чутливість до чорних плям та/або пошкодження врожаю слід зачекати щонайменше два тижні після знищення бадилля до збирання врожаю.

Температура зберігання - Тривалість зберігання

Рекомендована температура зберігання 4 °C. Підходить для постачання прямо з поля або короткострокового зберігання.



Say potato,
say Agrico.

Стійкість

Вірус скручування листя: Трохи вразливий / 7

Вірус - Yn: Від трохи до зовсім не вразливий / 8

Вірус - Yntn (бульба): Трохи вразливий / 7

Віруси Моп-топ і Тютюнової мозаїки: Дуже вразливий / 4

Фітофтороз листя: Дуже вразливий / 3

Фітофтороз бульби: Вразливий / 5

Фузаріоз: Трохи вразливий / 6

Парша звичайна: Вразливий / 5,5

Порошиста парша: Дуже вразливий / 2

Чорна пляма: Вразливий / 5,5

Ервінія (чорна ніжка): Вразливий / 5

Рак картоплі F1: Стійкий / 10

Золотиста нематода Ro 1/4: Стійкий / 9