

Спектра.

Середньоранній високоврожайний столовий сорт, має рівномірний розмір бульб з привабливою шкіркою жовтого кольору




**Торгові
мережі**
Свіжа



Традиційний

- » Великі бульби
- » Хороше бульбоутворення
- » Однорідність бульб



characteristics

Загальні характеристики

Схрещування: ARIELLE x SOFIA

Сіянець: SW 05-1431

Характеристика рослин та бульб

Група стиглості: Середньоранній / 7

Колір паростків: Червоно-фіолетовий / RV

Колір квітки: Білий / W

Кількість ягід: Дуже висока / 4

Початковий розвиток листя: Швидкий / 8

Остаточний розвиток листової маси: Доволі хороший / 7,5

Щільність листя: Середня / 6,5

Можливість вибору листя: Середня / 6

Колір шкірки: Жовтий / Y

Колір м'якуша: Світло-жовтий / 6

Формування шкірки: Дуже хороше / 7,5

Форма бульби: Овально-округла / OR

Рівномірність форми бульб: Рівномірна / 7,5

Бульбоутворення: Досить високе / 7

Розмір бульби: Досить великий / 7,5

Рівномірність розміру: Досить рівномірна / 6,5

Період спокою: Досить короткий / 5

Чутливість і якість

Вторинний ріст: Досить чутливий / 6,5

Чорна пляма (внутрішній синець): Малочутливий / 7,5

Тріщини росту: Досить чутливий / 6

Механічні пошкодження при збиранні: Досить чутливий / 6

Метрибузин - досходове застосування: Малочутливий / 7

Метрибузин - післясходовий: Малочутливий / 7,5

Бентазон: Від малочутливого до нечутливого / 8

Етилен: від 5% менше до 5% більше бульб / 5

Питома вага: 324

Вміст сухої речовини: 17,9%

Кулінарний тип: Слаборозваристий, тип АВ / АВ

Зміна кольору після приготування: Досить чутливий / 6

Знебарвлення сирого матеріалу: Дуже чутливий / 4

Придатність для смаження: Непридатний / 4,5

Придатність для переробки на чіпсів: Непридатний / 4

TGA-рівень: 4,7


www.agrico.com.ua

How to grow

Система удобрення та обробка насіння ¹

Азот: стандартна норма

Фосфат: стандартна норма

Калій: стандартна норма

Обробка насіння

Можна висаджувати безпосередньо з холодильної камери, бажано після короткого теплового шоку. Обламування паростків може мати негативний вплив на врожайність і вирівняність бульб.

Planting distance

28/35 мм: 27 см (32.000 кущів/га)

35/55 мм: 33 см (35.000 кущів/га)

Висаджуйте Спектру трохи глибше, ніж інші сорти, щоб уникнути появи зелених бульб.

¹ Рівень удобрення, що ґрунтується на результатах аналізу ґрунту

Бур'яни

Після появи сходів стандартне застосування метрибузину (Зенкор) може спричинити певну реакцію листя та деяке зниження врожайності.

Фунгіциди

Необхідний суворий профілактичний графік обприскування проти фітофторозу.

Врожай

Через чутливість до чорних плям та/або пошкодження врожаю слід зачекати щонайменше два тижні після знищення бадилля до збирання врожаю.

Температура зберігання - Тривалість зберігання

Рекомендована температура зберігання 4 °C. Підходить для середньострокового зберігання.



Say potato,
say **Agrico.**

Стійкість

Вірус - Yn: Трохи вразливий / 6

Вірус - Yntn (бульба): Трохи вразливий / 7

Віруси Моп-топ і Тютюнової мозаїки: Вразливий / 5

Фітофтороз листя: Дуже вразливий / 4,5

Фітофтороз бульби: Трохи вразливий / 6

Фузаріоз: Вразливий / 5,5

Парша звичайна: Вразливий / 5

Порошиста парша: Дуже вразливий / 4

Чорна пляма: Вразливий / 5

Рак картоплі F1: Стійкий / 10

Золотиста нематода Ro 1/4: Стійкий / 9