


Твістер.

Середньоранній сорт для традиційного та органічного вирощування з хорошою врожайністю та стійкістю до фітофторозу листя і бульб.

- » Привабливий зовнішній вигляд
- » Добре зберігається
- » Слаборозваристий



Органічний
продукт
Органічний

Торгові
мережі
Свіжа

Традиційний



Характеристики

Загальні характеристики

Схрещування: ARG 96-0739 x AR 02-9113

Сіянець: TW 08-1507

Характеристика рослин та бульб

- Група стиглості: Середньоранній / 7
- Колір паростків: Червоно-фіолетовий / RV
- Колір квітки: Світло-бузковий / LP
- Кількість ягід: Вище середньої / 5,5
- Початковий розвиток листя: Досить швидкий / 7
- Остаточний розвиток листової маси: Доволі хороший / 7,5
- Щільність листя: Досить щільна / 7
- Можливість вибору листя: Середня / 6,5
- Колір шкірки: Жовтий / Y
- Колір м'якуша: Світло-жовтий / 6,5
- Формування шкірки: Хороше / 7
- Форма бульби: Округло-овальна / RO
- Рівномірність форми бульб: Рівномірна / 7
- Бульбоутворення: Середнє / 6
- Розмір бульби: Досить великий / 7
- Рівномірність розміру: Досить рівномірна / 6,5
- Період спокою: Досить довгий / 7

Чутливість і якість

- Вторинний ріст: Досить чутливий / 6,5
- Чорна пляма (внутрішній синець): Від малочутливого до нечутливого / 8
- Тріщини росту: Досить чутливий / 6,5
- Механічні пошкодження при збиранні: Малочутливий / 7
- Метрибузин - досходове застосування: Дуже чутливий / 3
- Метрибузин - післясходовий: Дуже чутливий / 3
- Бентазон: Досить чутливий / 6
- Етилен: на 5% менше бульб / 4
- Питома вага: 345
- Вміст сухої речовини: 19%
- Кулінарний тип: Слаборозваристий, тип АВ / АВ
- Зміна кольору після приготування: Досить чутливий / 6,5
- Знебарвлення сирого матеріалу: Досить чутливий / 6
- Придатність для смаження: Непридатний / 5
- Придатність для переробки на чіпсів: Непридатний / 4
- TGA-рівень: 5,63

Рекомендації щодо вирощування



www.agrico.com.ua

Система удобрення та обробка насіння ¹

Азот: до стандартної норми +20%

Фосфат: стандартна норма

Калій: стандартна норма

Обробка насіння

Можна висаджувати безпосередньо з холодильної камери, бажано після короткого теплового шоку. Допускається разове обламання ростків.

Відстань між рослинами

28/35 мм: 22 см (60.500 кущів/га)

35/50 мм: 25 см (54.000 кущів/га)

¹ Рівень удобрення, що ґрунтується на результатах аналізу ґрунту

Бур'яни

Після появи сходів не використовуйте метрибузин (Зенкор), оскільки він викликає сильну реакцію листя та значне зниження врожайності.

Фунгіциди

Незважаючи на стійкість до фітофторозу, зберігайте пильність щодо інфекцій.

Врожай

Через чутливість до чорних плям та/або пошкодження врожаю слід зачекати щонайменше два тижні після знищення бадилля до збирання врожаю.

Температура зберігання - Тривалість зберігання

Рекомендована температура зберігання 6 °C. Підходить для середньо- та довгострокового зберігання.



Say potato,
say Agrico.

Стійкість

Вірус - Yn: Від трохи до зовсім не вразливий / 8

Вірус - Yntn (бульба): Від трохи до зовсім не вразливий / 8

Віруси Моп-топ і Тютюнової мозаїки: Трохи вразливий / 6

Фітофтороз листя: Від трохи до зовсім не вразливий / 9

Фітофтороз бульби: Від трохи до зовсім не вразливий / 9

Фузаріоз: Трохи вразливий / 6

Парша звичайна: Трохи вразливий / 6

Порошиста парша: Вразливий / 5

Чорна пляма: Трохи вразливий / 7

Рак картоплі F1: Помірно вразливий / 8

Золотиста нематода Ro 1/4: Стійкий / 9